

## **Buprecare (buprenorfina 0.3mg/ml)- 10 ml BEL LUCIA R24694(607)**

I.D.: 54041182

Data publicarii 08.02.21 Coduri CPV 33600000-6

Pretul estimativ: 980,00 RON - 980,00 RON

Descriere: Conditii neacceptate la termen: BUPRECARE Substanță activă: Buprenorfină (sub formă de clorhidrat de buprenorfină) 0,3 mg Soluție injectabilă. Soluție limpede, incoloră. Specii țintă Câini și pisici Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă CÂINI Analgezia post-operatorie. Potențarea efectelor sedative ale medicamentelor cu acțiune la nivel central. PISICI Analgezia post-operatorie. Contraindicații Nu se administrează pe cale intratecală sau peridurală. Nu se utilizează preoperator pentru intervenția chirurgicală de cezariană. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă. Nu există. Cantități de administrat și calea de administrare Administrare: Câini Injecție intramusculară sau intravenoasă Pisici Injecție intramusculară sau intravenoasă Înaintea administrării trebuie determinată cât mai precis greutatea animalului. Specii Analgezia post-operatorie Potențarea sedării Câini 10-20 µg per kg (0,3-0,6 ml per 10 kg) Pentru diminuarea în continuare a durerii, repetați administrarea dacă este necesar după 3-4 ore cu 10 µg per kg sau 5-6 ore cu 20 µg per kg. 10-20 µg per kg (0,3-0,6 ml per 10 kg) Pisici 10-20 µg per kg (0,3-0,6 ml per 10 kg), repetați dacă este necesar, o dată, după 1-2 ore. - În timp ce efectele sedative sunt prezente la 15 minute după administrare, activitatea analgezică devine evidentă după aproximativ 30 minute. Pentru a asigura faptul că este prezentă analgezia în timpul i