

SENCOR LIQUID 600SC, 5L si SENCOR LIQUID 600SC, 500ml

I.D.: 79661655

Data publicarii 09.03.23 Coduri CPV 24453000-4

Pretul estimativ: 2.065,00 RON - 2.065,00 RON

Descriere: MOD DE UTILIZARE Cartof: se utilizează la doza de 0,9 l/ha preemergent după plantare pe întreaga suprafață, la refacerea bilonului, urmat de un tratament postemergent la doza de 0,6 l/ha când plantele de cartof au până la 5 cm înălțime (2-3 frunzulițe formate). În cazul infestării puternice cu buruieni monocotiledonate se recomandă utilizarea în asociație cu un erbicid antigramineic. Tomate semănat direct în câmp: se efectuează 2 erbicidări pe întreaga suprafață: una preemergentă după semănat în doză de 0,45 l/ha, urmată de a doua erbicidare postemergentă în doză de 0,35 l/ha la un interval de minim 40 de zile Tomate transplantate în câmp: se efectuează o erbicidare la doza de 0,6 l/ha, cu 5 zile înainte de plantare, urmată de un tratament cu 0,35 l/ha după plantare. Soia: se efectuează o erbicidare preemergentă după semănat, înainte de răsărire, folosind doza de 0,35 l/ha. Volum de soluție: 300 l/ha. Nu se aplică pe soluri nisipoase. Nu se utilizează Sencor pentru culturile de tomate în seră. SPECTRUL DE COMBATERE ÎN CULTURA CARTOFULUI Buruieni dicotiledonate: Știr (*Amaranthus retroflexus*), iarba pârlomagelor (*Ambrosia artemisiifolia*), scânțieiuța (*Anagallis arvensis*), lobodă (*Atriplex patula*), traista cioaba nului (*Capsella bursapastoris*), albăstrele (*Centaurea cyanus*), spanac sălbatic (*Chenopodium album*), ciunăfaie (*Datura stramonium*), fumăriță (*Fumaria officinalis*), lungurica (*Galeopsis tetrahit*), busuioc sălbatic (*Galinsoga parviflora*), sugel puturos (*Lamium purpureum*), m