

Dispozitiv de masurare indice glezna-brat ABPI

I.D.: 62187756

Data publicarii	19.10.21	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.500,00 RON - 9.500,00 RON

Descriere: ispozitiv automat de măsurare a indicelui gleznă-braț (ABPI MDTM) care vă dă posibilitatea de a vă diagnostica pacienții mai rapid! Boala arterială periferică (BAP), crește riscul unui atac de cord sau accident vascular cerebral. Boala arteriala periferica este o afecțiune gravă, cauzată de o circulație insuficientă la nivelul picioarelor. Arterele membrelor inferioare sunt îngustate de plăci aterosclerotice - acumulări de colesterol în pereții arteriali - care restricționează fluxul de sânge bogat în oxigen. Boala poate apărea la toate arterele corpului. Aproape 60% dintre pacienții cu BAP prezintă artere obstrucționate la nivelul picioarelor, precum și al inimii și creierului. Indicele gleznă-braț (ABI) ar trebui să fie măsurat în asistența medicală primară ca o metodă de diagnosticare și monitorizare a BAP. Dispozitivul automat de măsurare a indicelui gleznă-braț (ABPI MDTM) vă dă posibilitatea de a vă diagnostica pacienții mai rapid! Scala indicelui gleznă-braț: 1.41 sau mai mult - necompresibil 1.40-1.00 - normal 0.99-0.91 - la limită 0.90 - 0.41 - anormal 0.40 sau mai puțin - grav Valoarea normală a ABI este cuprinsă între 1,00 și 1,40. Aceasta arată că tensiunea arterială a membrelor inferioare este egală sau puțin mai mare decât la nivelul extremităților superioare.4 Măsurarea indicelui gleznă-braț realizată de ABPI MDTM este o alternativă sigură și mai rapidă decât măsurarea cu sonda Doppler. Avantaje: - nu necesita specializare; - durata investigatie
